



VER FICHA TÉCNICA

KISQALI® en 1L en CMM HR+/HER2-, independientemente del estado menopáusico, el fármaco de combinación y la sensibilidad hormonal^{1,2,3}

Estudio MONALEESA-7

Mediana de supervivencia global

~5 años⁴

(~1 año de vida vs. PBO)⁴
 58,7 meses RIB + IA vs. 48 meses PBO + IA⁴
 (HR: 0,71; IC 95 %: 0,54 - 0,95)³

Estudio MONALEESA-3

Mediana de supervivencia global

~4,5 años⁵

(+1 año de vida vs. PBO)⁵
 53,7 meses RIB + FUL vs. 41,5 meses PBO + FUL⁵
 (HR: 0,72; IC 95 %: 0,57 - 0,92)²

Estudio MONALEESA-2

Mediana de supervivencia global

~5,5 años¹

(+1 año de vida vs. PBO)¹
 63,9 meses RIB + IA vs. 51,4 meses PBO + IA¹
 (HR: 0,76; IC 95 %: 0,63 - 0,93)¹



KISQALI® es el único iCDK4/6 que ha demostrado beneficio en supervivencia global estadísticamente significativo en pacientes posmenopáusicas en 1L en combinación con IA en CMM HR+ HER2-^{1, 7, 8}

1L: primera línea; **CMM:** cáncer de mama metastásico; **FUL:** fulvestrant; **HER2-:** receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo; **HR:** hazard ratio; **HR+:** receptor hormonal positivo; **IA:** inhibidor de la aromatasa; **IC:** intervalo de confianza; **iCDK:** inhibidor de quinasa dependiente de ciclinas; **PBO:** placebo; **RIB:** ribociclib; **1:** Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. Overall survival results from the phase III MONALEESA-2 trial of postmenopausal patients with HR+/HER2- advanced breast cancer treated with endocrine therapy ± ribociclib. Presented at: 2021 European Society for Medical Oncology; September 16-21, 2021. **2:** Slamon DJ, et al. N Engl J Med. 2020;382(6):514-24. **3:** Im SA et al. N Engl J Med. 2019;381:307-316. **4:** Tripathy D, Im S-A, Colleoni M, et al. Updated overall survival (OS) results from the phase III MONALEESA-7 trial of pre- or perimenopausal patients with hormone receptor positive/human epidermal growth factor receptor 2 negative (HR+/HER2-) advanced breast cancer (ABC) treated with endocrine therapy (ET) ± ribociclib. San Antonio Breast Cancer Virtual Symposium; December, San Antonio, Texas 2020. p. PD2-04. **5:** Slamon D, Neven P, Chia S, et al. Updated overall survival (OS) results from the Phase III MONALEESA-3 trial of postmenopausal patients (pts) with HR+/HER2- advanced breast cancer (ABC) treated with fulvestrant (FUL) ± ribociclib (RIB). ASCO Annual Meeting 2021. **6:** Ficha Técnica Kisqali®. Novartis Europharm Limited. **7:** Rugo HS, et al. Breast Cancer Research and Treatment (2019) 174: 719-729. **8:** Johnston S, et al. npj Breast Cancer. 2019; 5:1-5.



▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.



ES211203888