

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE ERIBULINA COMO TRATAMIENTO PALIATIVO DE CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO EN CONDICIONES DE PRÁCTICA CLÍNICA



Carrasco Piernavieja L¹, Domínguez Bachiller M¹, Oterino Moreira I¹,

Zhan Zhou E¹, Toro Chico P¹, Olier Garate C², Pérez Encinas M¹

¹Servicio de Farmacia. ²Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid)



OBJETIVO

Analizar la efectividad y seguridad de eribulina como tratamiento paliativo en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibieron previamente otras líneas de tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

○ Estudio observacional retrospectivo entre octubre 2011 y septiembre 2019 en un hospital terciario.

✓ Criterios INCLUSIÓN

- Cáncer de mama metastásico
- Eribulina paliativa en monoterapia
- > 1 línea previa de tratamiento

✗ Criterios EXCLUSIÓN


- < 2 ciclos de eribulina

○ Variables:

| Demográficas | Clínicas | De efectividad | De toxicidad |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edad ▪ Sexo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ECOG al inicio ▪ Tipo de cáncer ▪ Localización de metástasis ▪ Líneas previas ▪ Número de ciclos de eribulina | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Supervivencia libre de progresión (SLP) ▪ Supervivencia global ▪ Tasa de respuesta objetiva (TRO) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reducción de dosis ▪ Reacciones adversas (RA) ▪ Grado de toxicidad |

○ Análisis estadístico: SPSS v19.0

RESULTADOS



CONCLUSIONES

- Los resultados muestran una mediana de SLP y de SG similares a las obtenidas en el ensayo pivotal EMBRACE, por lo que eribulina podría ser una opción a tener en cuenta en pacientes con enfermedad avanzada.
- Respecto a la seguridad, eribulina puede considerarse una alternativa terapéutica bien tolerada, presentando la mayoría de los pacientes RA grado I-II.