

NIVOLUMAB: EXPERIENCIA DE USO EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

Lopez Suarez D, Álvarez Núñez N, Ferreras López N, Guerra González M, Lamas Lorenzana S, González González MA

Objetivos:

- 1.- Describir la **efectividad** del uso de nivolumab en pacientes oncológicos en **estadio IV** en un hospital de segundo nivel.
- 2.- Conocer en las 5 indicaciones utilizadas el **motivo de suspensión del fármaco**.

Material y métodos:

- Estudio observacional retrospectivo de **3 años** de duración (2015-2018).
- Población: pacientes oncológicos en **estadio IV tratados con nivolumab**.
- Variables:
 - Basales: edad, sexo, indicación.
 - Relacionadas con efectividad: Supervivencia Libre de Progresión (SLP), o número de meses de tratamiento si continúan en tratamiento activo.
 - Motivo de suspensión de nivolumab: (progresión, efectos secundarios, éxitus).
- Recogida y tratamiento de datos: historia clínica Jimena® 3 y Excel 2011.

RESULTADOS

SLP en 2 pacientes: 6 y 14 meses. Pacientes en tratamiento: 2(2 y 9 meses). 1 paciente continúa en respuesta a pesar de no estar en tratamiento (seguimiento de 41 meses).

Mediana de SLP en 6 pacientes: 3 meses (2-5). Pacientes en tratamiento: 2 (2 y 12 meses).

Mediana de SLP en 3 pacientes: 3 meses (1-8). Pacientes en tratamiento: 2 (4 y 18 meses).

Mediana de SLP: 3 meses (1-25). Pacientes en tratamiento: 3 (14, 37 y 38 meses).

	CPNM	Melanoma	Cáncer Renal	Cabeza y cuello	Cáncer urotelial
Nº pacientes	25	5	8	5	1
Sexo % (M-V)	12-88	60-40	13-87	0-100	0-1
Mediana edad (años)	65	75	65	73	72
motivo de suspensión (nº de pacientes):					
- progresión	8	2	4	3	0
- efectos 2º	8	0	1	0	0
- éxitus	6	0	1	0	0

13 meses en tratamiento

Conclusiones

- Nivolumab es el primer fármaco de la familia de los inmunomoduladores.
- Siendo un estudio con pocos pacientes, sí que parece que **hay pacientes respondedores** a nivolumab y **otros que progresan rápidamente** en todas las indicaciones.
- Hacen falta estudios que nos digan si esa disparidad es debida al porcentaje de Programmed Death –ligand 1 (PD-L1) o a algo más, y saber de antemano que pacientes se beneficiarían más.
- Las **reacciones adversas** descritas contrastan con la ficha técnica, no obstante, un **22% de los pacientes suspendieron el tratamiento por este motivo**.